

CYTOTEC TABLET - 200 MCG

Bevat per tablet 200 microgram misoprostol.

Dit is een verkorte uitleg voor gebruik van medicatie, voorgeschreven door Gynaikon Klinieken.

Voor de volledige bijsluiter zie: <https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h24206.pdf>

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof **misoprostol**.

WERKING:

Door het samentrekken van de baarmoederspier helpt misoprostol (Cytotec) bij het afbreken van de zwangerschap. De zwangerschapsafbreking is al in gang gezet door een tablet mifepriston (Mifegyne) van 200 mg die u in de kliniek heeft ingenomen.

DOSERING:

24 tot 72 uur na de mifepriston (Mifegyne) worden 4 tabletten misoprostol van 200 microgram ingebracht in de vagina of de wangzakken.

Als de tabletten worden geslikt (hoewel wij dit niet adviseren), is het raadzaam dit bij de maaltijd te doen.

LET OP: u **moet** deze tabletten gebruiken, óók als u al bent gaan bloeden als gevolg van de mifepriston.

WANNEER BEGINT DE WERKING:

Het bloedverlies zal in ongeveer 95% van de gevallen binnen 24 uur optreden.

BIJWERKINGEN

Bij meer dan 10% van het gebruik zal diarree optreden. Deze verdwijnt vanzelf.

Bij 1-10% kunnen bijwerkingen optreden als maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven, verstopping), hoofdpijn en duizeligheid. Ook is misoprostol schadelijk voor de vrucht in 10% van de gevallen. Daarom raden wij bij eventueel mislukken van de zwangerschapsafbreking met de abortuspil, een zuigcuretage aan.

BORSTVOEDING

Door het gebruik van misoprostol is het mogelijk dat een baby door borstvoeding diarree krijgt. Daarom het advies om gedurende 12 uur af te kolven en de melk niet te gebruiken.

OVERIGE OPMERKINGEN

Misoprostol is in Nederland op de markt als een middel dat de maag beschermt tegen overmatig maagzuur bij het gebruik van pijnstillers zoals bijvoorbeeld Diclofenac.

Als middel voor een zwangerschapsafbreking is het eigenlijk niet geregistreerd. Een arts mag een middel wel 'off label' voorschrijven als daar een indicatie voor is. Het is uitgebreid aangetoond dat misoprostol goed werkt als medicatie bij een zwangerschapsafbreking.

Disclaimer:

De inhoud van deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie in deze folder op een bepaald moment actueel juist, volledig of van toepassing is. De inhoud van deze folder is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

GYNAIKON KLINIEKEN

Strevelsweg 700 - 204, 3083 AS Rotterdam
Bredeweg 239 - S1, 6043 GA Roermond

tel. +31 (0)88 8884444
info@gynaikon.nl

AGB-code 49-493202
www.gynaikonklinieken.nl